



Fremanezumab (s.c. a-CGRP)

Gebruuchsanweisung fir d'Fäerdegspätz

Fremanezumab 225 mg Fäerdegspätz fir d'Virbeugung vu Migrän bei Erwuessenen, déi op d'mannst 4 Migrändeege de Mount hunn.

Liest virum dem Gebrauch vun der Fäerdegspätz Fremanezumab d'Schrëtt-fir-Schrëtt-Uleedung suergfältig duerch.

Virbereedung vun der Injektioun


- Huel d'Fremanezumab-Fäerdegspätz aus der Verpackung; **rëselt se net**.
- Loosst Fremanezumab virun der Injektioun **30 Minutte** laang bei Raumtemperatur stoen.
- Bereet déi follgend Artikelen vir:
 - 1 oder 3 Fremanezumab-Fäerdegspätz 225 mg, jee nodeem, wat Ären Dokter lech verschriwwen huet
 - Alkoholkompressen ➤ oder Wattbällcher ➤ Nolebehälter.

Wichtig:

- D'Fremanezumab-Fäerdegspätz ass nëmme fir den Eemolgebrauch bestëmmt.
- Jiddwer Fäerdegspätz enthält 225 mg Fremanezumab. Jee no Ärer Dosis sollt Dir 1 Fäerdegspätz oder 3 Fäerdegspätz benotzen.
- Fremanezumab gëtt ënner d'Haut agespätzt (subkutan Injektioun). Dir dierft lech eréischt da selwer eng Injektioun ginn, wann Dir dat mat Ärem Dokter oder dem medezinesche Fachpersonal geübt hutt.
- Liest d'Packungsbäilag suergfältig duerch, fir méi iwwer Äert Medikament gewuer ze ginn.
- **Rëselt d'Fäerdegspätz net.**
- **Leet d'Verpackung direkt zeréck an de Frigo**, wann nach onbenotzt Fäerdegspätz an der Verpackung sinn.

Uweisung fir d'Injektioun

Schrëtt 1: Wäscht Är Hänn mat Waasser a Seef an drécht se grëndlech mat engem propperen Handduch.





Schrëtt 2: Iwwerpréift Är Fremanezumab-Fäerdegspätz.

- Iwwerpréift, ob den Numm Fremanezumab op der Fäerdegspätz opgedréckt an de Verfallsdatum op der Etikett nach net ofgelaf ass.
- Iwwerpréift, ob duerch d'Sichtfëster vun der Fäerdegspätz d'Medikament eng faarflos bis blatzeggiel Faarf huet.

Net benotzen, wann:

- D'Fäerdegspätz méi laang ewéi 7 Deeg aus dem Frigo war;
- De Verfallsdatum op der Fäerdegspätz ofgelaf ass;
- D'Fäerdegspätz siichtbar Schied wéi Rëss oder Fuitten opweist;
- Sech Partikelen an der Flëssegkeet befannen oder se verfierft oder dréif ass oder se gefruer war.






Et kënne Loftblosen an der Fäerdegspätz sinn. Dat ass normal.

Versicht net, d'Loftblosen virun der Injektioun aus der Fäerdegspätz ewechzehuelen.

Schritt 3:

Wählt eng Injektionsplatz.

- Bauchbereich (Abdomen): Vermeide e Bereich vun ca. 5 cm ronderëm den Nabel.
- Vordersait vum Uewerschenkel: E Bereich, deen op d'mannst 5 cm iwwer dem Knéi a 5 cm ënner der Leeschtegéigend läit.
- Récksait vum Ueweraarm: am fleeschegen Deel vum Ueweraarm.



Wa méi Injektionen erfuerderlech sinn, kënnt Dir d'Injektionen am selwechte Beräich oder an engem anere Beräich (Bauch, Uewerschenkel, Ueweraarm) virhuelen. Stellt dobäi sécher, datt Dir net op genee der selwechter Plaz injektéiert.

Schritt 4:


Rengegt d'Injektionsplatz.

- Rengegt d'Injektionsplatz mat enger neier Alkoholkompress.
- Loosst d'Haut virun der Injektion 10 Sekonnen dréchnen.
- Injektéiert Fremanezumab net an e Beräich, deen empfindlech, rout, waarm, verhäert oder tätowéiert ass, oder a blo Plazen, Narben oder Schwangerschaftssträifen.

Schritt 5:

Huelt d'Schutzkëppchen ewech a leet se op d'Sait.

- Zéit d'Schutzkëppche riicht of. Net dréien.
- Setzt d'Schutzkëppchen net nees op d'Fäerdegspätz, fir Verletzungen an Infektionen ze vermeiden.
- Berieert den Nolschutzberäich net.



Schritt 6:

- A. Setzt d'Fäerdegspätz an engem 90 Grad-Wénkel op d'Haut op.
- B. Dréckt d'Fäerdegspätz no ënnen, fir se ze aktivéieren; et gëtt kee Knäppchen. Dir héiert e **KLICK**. De bloe Kolbe beweegt sech duerch d'Fenster no ënnen.
- C. Haalt d'Fäerdegspätz ongeféier **15 Sekonnen** op Är Haut gedréckt, bis Dir en zweete **KLICK** héiert.
- D. Waart elo nach **10 Sekonnen**, éier Dir d'Fäerdegspätz vun der Haut ewechzitt.


Dauer: 30 Sekonnen
Opgepasst: Haalt während der gesamter Injektionsdauer e konstanten Drock op d'Fäerdegspätz



Schritt 7:

Zitt d'Spätz aus der Haut eraus.

Iwwerprüift, ob de bloe Kolben d'Sichtfenster ausfüllt. Dir kënnt elo de groe Stopp gesinn. Zitt d'Fäerdegspätz riicht vun der Haut ewech. Wann Dir d'Fäerdegspätz aus der Haut zitt, kéiert den Nolschutz a seng ursprénglech Positioun zeréck a verrigelt sech, a bedeckt esou d'Nol. Setzt d'Schutzkëppchen **nimmols erëm** op d'Fäerdegspätz zeréck, fir Verletzungen an Infektionen ze vermeiden.



Schritt 8:

Dréckt mat engem propperen, dréchene Wattebällchen oder enger Kompress e puer Sekonne laang virsiichteg op d'Injektionsplatz. Reift net un der Injektionsplatz a benotzt d'Fäerdegspätz net nach eng Kéier.

Schritt 9:

Entsuergt d'Fäerdegspätz.

- Geheet Är gebrauchte Fäerdegspätz nom Gebrauch an en Nolebehälter.
- Entsuergt gebrauchte Fäerdegspätzen net an der Dreckskëscht.
- Benotzt Behälter fir scharf Offäll nom Gebrauch net erneit.
- Wann Är Dosis 675 mg bedréit, widderhuel d'Schritt 2 bis 9 mat der zweeter an drëtter Fremanezumab-Fäerdegspätz, fir déi gesamt Dosis anzesprätzen.
- Frot Ären Dokter, Apdikter oder d'medezinescht Fachpersonal, wéi de Behälter ze entsuergen ass.

Umierung:

An der Packungsbäilag fannt Dir vollstänneg Instruktiounen fir d'Aginn vun der Injektion mat Fremanezumab.

Ce matériel est purement informatif et ne doit être remis par un médecin à un patient qu'après qu'il a été décidé que le patient recevrait ce traitement.

teva