



fremanezumab (s.c. a-CGRP)

instruções de utilização da caneta

Fremanezumab 225 mg Caneta pré-cheia para a prevenção de enxaquecas em adultos com pelo menos 4 dias de enxaqueca por mês.

Antes de utilizar a caneta pré-cheia com fremanezumab, leia as instruções passo a passo e siga-as cuidadosamente.

Preparação da injeção


- Retire a caneta pré-cheia de fremanezumab da embalagem; **não a agite**.
- Deixe o fremanezumab para injeção fora do frigorífico **durante 30 minutos** até ficar à temperatura ambiente.
- Tenha consigo os seguintes objectos:
 - 1 ou 3 caneta(s) pré-cheia(s) de fremanezumab 225 mg, consoante a prescrição do seu médico.
 - Toalhetes com álcool ➤ Gazes ou algodões ➤ Recipiente para agulhas.

Importante:

- A caneta pré-cheia com fremanezumab destina-se a uma única utilização.
- Cada caneta pré-cheia contém 225 mg de fremanezumab. Consoante a dose, deve utilizar 1 ou 3 canetas pré-cheias.
- O fremanezumab é injetado sob a pele (injeção subcutânea). Não deve administrar uma injeção a si próprio antes de praticar com o seu médico ou enfermeiro.
- Leia atentamente o folheto informativo para saber mais sobre o seu medicamento.
- **Não agite** a caneta pré-cheia.
- **Coloque a caixa imediatamente de volta no frigorífico**, se a caixa ainda contiver canetas pré-cheias por utilizar.

Instruções passo a passo para a injeção

Passo 1: Lave as mãos com água e sabão e seque-as bem com uma toalha limpa.





Passo 2:
Verifique a sua caneta pré-cheia fremanezumab.

- Verifique se a caneta contém o nome fremanezumab e se o prazo de validade indicado no rótulo ainda não expirou.
- Verifique, através do visor da caneta, se o medicamento tem um aspeto límpido e se é incolor a amarelo pálido.

Não utilizar se:

- A caneta tiver estado fora do frigorífico durante mais de 7 dias;
- O prazo de validade indicado na caneta tiver expirado;
- A caneta apresentar danos visíveis, como rupturas ou vazamentos;
- Se se encontrarem partículas no líquido ou se o mesmo estiver (ou tiver estado) descolorido, turvo ou congelado.





A caneta pré-cheia pode conter bolhas de ar. Isto é normal.
Não tente remover bolhas de ar da caneta antes de administrar a injeção.

Passo 3:

Escolha o local para aplicar a injeção.

- Abdómen (parte inferior do abdómen): evite uma área de cerca de 5 cm à volta do umbigo.
- Parte da frente das coxas: uma zona pelo menos 5 cm acima do joelho e 5 cm abaixo da virilha.
- Parte de trás dos braços: na parte carnuda da parte de trás dos braços.



Se forem necessárias várias injeções, estas podem ser administradas na mesma zona ou noutra zona (abdómen, coxa, braço). Ao fazê-lo, certifique-se de que não injecta exatamente no mesmo local.

Passo 4:


Escolha o local para aplicar a injeção.

- Desinfeite o local para aplicar a injeção com um toalhete limpo e com álcool.
- Deixe a pele secar durante 10 segundos antes da injeção.
- Não injetar Fremanezumab numa área sensível, vermelha, quente, endurecida ou tatuada, ou em nódulos negros, cicatrizes ou estrias.

Passo 5:


Retire a tampa de proteção e guarde-a.

- Puxe a tampa de proteção no sentido horizontal. Não vire.
- Não volte a colocar a tampa protetora na caneta para evitar ferimentos e infeções.
- Não toque na zona da proteção da agulha.



Passo 6:


- Coloque a caneta pré-cheia num ângulo de 90 graus contra a sua pele.
- Prima a caneta para a ativar; não existe nenhum botão. Ouvirá um **CLIQUE**. O pistão azul move-se para baixo através do visor.
- Segure a caneta durante cerca de **15 segundos** pressionada contra a pele, até ouvir um segundo **CLIQUE**.
- Agora aguarde **10 segundos** antes de retirar a caneta da pele.



Passo 7:

Retire da pele.

Verifique se o pistão azul preencheu o visor, podendo agora ver o tampão cinzento. Retire a caneta da pele no sentido vertical. Quando se levanta a caneta da pele, a proteção da agulha volta à sua posição original e bloqueia, cobrindo a agulha. **Nunca** volte a colocar a tampa protetora na caneta para evitar ferimentos e infeções.



Passo 8:

Utilize uma bola de algodão limpa e seca ou uma gaze para pressionar suavemente o local da injeção durante alguns segundos. Não esfregue o local da injeção nem volte a utilizar a caneta.

Passo 9:

Deite fora a caneta pré-cheia.

- Coloque a caneta usada num recipiente para agulhas imediatamente após a utilização.
- Não deite fora as canetas usadas no caixote do lixo.
- Não volte a utilizar os recipientes para resíduos cortantes.
- Se a sua dose for de 675 mg, repita os passos 2 a 9 com a segunda e terceira caneta fremanezumab para injetar a dose completa.
- Pergunte ao seu médico, farmacêutico ou enfermeiro como eliminar o recipiente.

Observação:

Consulte o texto do folheto informativo para obter instruções completas sobre como administrar a injeção de Fremanezumab.

Ce matériel est purement informatif et ne doit être remis par un médecin à un patient qu'après qu'il a été décidé que le patient recevrait ce traitement.

teva